



	Durata in settimane	Luce/giorno in ore	Terra Vega ml/ 10 Litri	Terra Flores ml/ 10 Litri	RHIZOTONIC ml/ 10 Litri	CANNAZYM ml/ 10 Litri	CANNABOOST ml/ 10 Litri	PK 13/14 ml/ 10 Litri	EC + in mS/cm	EC totale in mS/cm	
FASE VEGETATIVA											
CRESCITA	Inizio / radicazione (3-5 giorni) - Inumidire il substrato	1	18	15-35	-	40	-	-	0,4-0,8	0,8-1,2	
	Fase vegetativa I - Accrescimento del volume della pianta	0,3 ¹	18	30-50	-	20	25	-	0,7-1,1	1,1-1,5	
	Fase vegetativa II - Fino alla stagnazione della crescita dopo la fruttificazione o i primi segni di sviluppo floreale	2-4 ²	12	35-55	-	20	25	20 ⁵	-	0,9-1,3	1,3-1,7
FASE GENERATIVA											
FIORITURA	Fase generativa I - Sviluppo in lunghezza dei fiori o dei frutti. Arresto della crescita in altezza	2-3	12	-	50-70	5	25	20-40	-	1,2-1,6	1,6-2,0
	Fase generativa II - Ingrandimento dei fiori o dei frutti (larghezza)	1	12	-	50-70	5	25	20-40	15	1,5-1,9	1,9-2,3
	Fase generativa III - Accrescimento dei fiori o dei frutti (peso)	2-3	12	-	40-60	5	25	20-40	-	1,0-1,4	1,4-1,8
	Fase generativa IV - Fine della maturazione dei fiori o dei frutti	1-2	10-12 ³	-	-	-	25-50 ⁴	20-40	-	0,0	0,4

- La durata di questo periodo dipende dal tipo di piante e dal numero di piante per m2. Le piante madri rimangono fino alla fine in questa fase (6-12 mesi)
- Il passaggio da 18 a 12 ore dipende dalla specie. In genere si esegue il passaggio dopo 2 settimane.
- Ridurre le ore di luce in caso di maturazione troppo rapida. Fare attenzione che l'umidità relativa dell'aria non aumenti troppo.
- Raddoppiare le dosi di CANNAZYM a 50 ml/10 litri se il substrato viene riutilizzato.
- Dose standard 20 ml/10L. Per una fioritura più rigogliosa aumentare fino a 40 ml/10 L

EC: il valore EC+ è calcolato in mS/cm con un valore EC dell'acqua = 0,0 in 25°C, pH 6,0 Sommare l'EC dell'acqua di rubinetto usata al valore EC consigliati! EC totale nell'esempio con acqua di rubinetto con un valore EC di 0,4.

pH: Valore consigliato del pH tra 5,8 e 6,2. L'aggiunta di pH meno può far aumentare il valore EC. Usare pH meno crescita nella fase vegetativa per abbassare il pH. Usare pH meno fioritura nella fase generativa per abbassare il pH

Le linee guida riportate nella tabella non sono leggi ferree, ma possono aiutare il coltivatore principiante a sviluppare una strategia di concimazione intelligente. La strategia di concimazione ottimale è inoltre determinata da fattori quali la temperatura, l'umidità dell'aria, il tipo di piante, il volume delle radici, il tasso di umidità nel substrato, il metodo di irrigazione e così via...



CANNNA
TERRA



CANNNA

The solution for growth and bloom